

Cuestionario de McGill – Melzack

Nombre:

Edad:

Diagnóstico:


Fecha:

Analgésicos:

1. Clase:
2. Dosificación:
3. Fecha de administración

Localización del dolor

Señalar en el siguiente grafico la zona donde se localiza el dolor.
Si el dolor es externo (E), si es interno (I), y si es ambos (EI).



Descripción del dolor (PRI)

1	2	3	4
Aletea	Brinco	pincha	Agudo
Tiembla	Destella	Perfora	Cortante
Late	Disparo	Taladra	Lacerante
Palpita		Apuñala	
Golpea		Lancinante	
Martillea			
5	6	7	8
Pellizca	Tira	Calienta	Hormigueo
Aprieta	Tracción	Quema	Picor
Roe	Arranca	hierve	Irritación
Acalambra		incinera	Aguijoneo
Aplasta			
9	10	11	12
Sordo	Sensible	Cansa	Marea
Penoso	Tirante	Agota	Sofoca

Hiriente	Áspero		
Irritante	Raja		
Pesado			
13	14	15	16
Miedo	Castigador	Desdichado	Molesto
Espanto	Abrumador	cegador	Preocupante
Pavor	Cruel		Intimidante
	Rabioso		Intenso
	Mortificante		Insoportable
17	18	19	20
Difuso	Apretado	Fresco	Desagradable
Irradia	Entumecido	Frio	Nauseabundo
Penetrante	Exprimido	Helado	Agónico
Punzante	Estrujado		Terrible
	Desgarrado		Torturante

Cambios que experimenta el dolor

Escoger la/las palabra/palabras que describan el patrón del dolor.

1	2	3
Continuo	Rítmico	Breve
Invariable	Periódico	Momentáneo
Constante	Intermitente	Transitorio

Factores que alivian el dolor:

Factores que agravan el dolor:

Intensidad del Dolor (PPI)

Elegir la palabra que mejor refleje la magnitud del dolor en este momento.

1	2	3	4	5
Ligero	Molesto	Angustioso	Horrible	Atroz

Sistema de puntuación

1. PRI (Pain rating index = índice de valoración del dolor)

Sensorial: (1-10)

Afectivo: (11 - 15)

Evaluativo: (16)

Miscelánea: (17-20)

2. PPI (P resentpainindex = índice de intensidad del dolor)

3. Número de palabras escogidas

Escala de Valoración Analógica (EVA)

NADA DE DOLOR

EL PEOR DOLOR

Dolor 0

Dolor 100

Gráficos

Gráfico 1: Porcentaje de pacientes según sexo




Gráfico 2: Porcentaje de pacientes según edad




Gráfico 3: Porcentaje de pacientes según tipo de cáncer




Gráfico 4: Porcentaje de pacientes según extensión del cáncer

- Sin metástasis
- Con metástasis próxima al tumor
- Con metástasis distante




Gráfico 5: Porcentaje de pacientes según tipo de metástasis




Gráfico 6: Comparación de la profundidad del dolor que presentaron los pacientes antes y después del tratamiento




Gráfico 7: Comparación de las etiologías del dolor que presentaron los pacientes antes y después del tratamiento




Gráfico 8: Comparación de las palabras utilizadas por los pacientes antes y después del tratamiento para describir al dolor




Gráfico 9: Comparación de los índice de valoración del dolor PRI antes y después del tratamiento




Gráfico 10: Comparación de los cambios de experiencia del dolor que experimentan los pacientes antes y después del tratamiento




Gráfico 11: Comparación de los factores que alivian el dolor indicados por los pacientes antes y después del tratamiento




Gráfico 12: Comparación de los factores que agravan el dolor indicados por los pacientes antes y después del tratamiento





Gráfico 13: Comparación del índice de intensidad del dolor PPI antes y después del tratamiento



Tablas

Tabla 1: Frecuencia y porcentaje de la utilización de anestesia en los pacientes al comienzo del trabajo de campo

Tipo de Anestesia	Número de pacientes que lo consumen	Porcentaje de pacientes que lo consumen
Morfina	9	75
Dipirona	8	66,7
Paracetamol	4	33,3
Ketorolac	3	25
Parche de Fentanilo	3	25
Ibuprofeno	2	16,7
Codeína	1	8,3
Ácido Acetilsalicílico	1	8,3

Tabla 2: Frecuencia y porcentaje de la utilización de anestesia en los pacientes al finalizar el trabajo de campo

Tipo de Anestesia	Número de pacientes que lo consumen	Porcentaje de pacientes que lo consumen
Morfina	4	50
Dipirona	3	37,5
Paracetamol	2	25
Ketorolac	2	25
Parche de Fentanilo	3	37,5
Ibuprofeno	2	25
Pergabalina	1	12,5
Ácido Acetilsalicílico	2	25
Tramadol	1	12,5

Tabla 3: EVA (escala de valoración analógica)

	15 días		30 días		45 días		60 días		75 días	
	Ante s	Despu és	Ante s	Despu és	Ante s	Despu és	Ante s	Despu és	Ante s	Despu és
1	5	2,5	7	5	1	0	/	/	/	/
2	4	3	3	2,5	3	2,5	3	2	3	2
3	3	3	6	3	4	3,5	/	/	/	/
4	1	0	1	3	0,5	0
5	8	6	5	2	10	5	5	1	4	1
6	10	9	9,7	9	9,9	9	9	5	9	5
7	8	5	10	8	10	5	3	2,5	/	/
8	4	2	5	2	7	5	5	3	4	2
9	7	3,5	7	4	/	/	/	/	/	/
10	3	2,5	3	2	/	/	/	/	/	/
11	10	9,5	/	/	/	/	/	/	/	/
12	10	9,9	10	9,5	/	/	/	/	/	/
Student Prueba T										
0,000650966			0,004682025		0,013714288		0,017594265		0,015233146	

/ = óbito del paciente

.. = interrupción del tratamiento

Tabla 4: Porcentaje de pacientes según intensidad del dolor antes y después del tratamiento kinésico

EVA	15 días		30 días		45 días		60 días		75 días	
	Antes	Después								
0-4	41,7	58,3	27,3	63,6	50	50	40	80	75	75
5-8	33,3	16,7	45,5	18,2	12,5	37,5	40	20	0	25
9-10	25	25	27,3	18,2	37,5	12,5	20	0	25	0