

Anexos

Tabla 1. Instrumento de Recolección de Datos

Nombre:	
Edad:	Evaluador:
Domicilio:	
Ocupación:	
Teléfono:	Fecha de Evaluación:
Tipo de TCE	Tiempo desde TCE:
Observación:	

Tabla 2. Escala de Valoración de la Discapacidad

Categorías	Componentes	Criterios	Puntaje
Excitabilidad, grado de conciencia y reactividad	Apertura ocular	espontánea	0
		al llamado	1
		al dolor	2
		ninguna	3
	Habilidad de comunicación	orientada	0
		confusa	1
		inapropiada	2
		incomprensible	3
		ninguna	4
	Respuesta motora	obedece órdenes	0
		localizada	1
		de retirada	2
		flexión al dolor	3
extensión al dolor		4	
	ninguna	5	
Capacidad cognitiva para Actividades Autocuidado	Alimentación	completa	0
		parcial	1
		mínima	2
		ninguna	3
	Higiene	completa	0
		parcial	1
		mínima	2
		ninguna	3
	Aseo personal	completa	0
		parcial	1
		mínima	2
		ninguna	3
Dependencia de otros	Nivel de funcionalidad	completamente independiente	0
		independiente en ambiente especial	1
		ligeramente dependiente	2
		moderadamente dependiente	3
		marcadamente dependiente	4
		totalmente dependiente	5

Capacidad de adaptación psicosocial	Empleabilidad	no restringida	0
		trabajos selectivos	1
		Talleres protegidos (no competitivos)	2
		No empleable	
<i>Categorías de Discapacidad</i>	Puntaje total	Nivel de Discapacidad	
	0	ninguno	
	1	leve	
	2 a 3	parcial	
	4 a 6	moderado	
	7 a 11	moderadamente severo	
	12 a 16	severo	
	17 a 21	extremadamente severo	
	22 a 24	estado vegetativo	
	25 a 29	estado vegetativo extremo	

Tabla 3. Medición de Independencia Funcional

ITEMS	Sub-escalas	Dominios	FIM total
A: Alimentación	AUTOCUIDADO (Self-care) 42 Puntos	MOTOR 91 Puntos	TOTAL PUNTOS 126
B: Aseo Menor			
C: Aseo Mayor			
D: Vestuario Cuerpo Superior			
E: Vestuario Cuerpo Inferior			
F: Aseo perineal			
G: Manejo vesical	CONTROL ESFINTERIANO 14 puntos		
H: Manejo intestinal	TRANSFERENCIAS 21 puntos		
I: Cama a silla			
J: Baño			
K: Tina o Ducha	LOCOMOCION 14 puntos		
L: Marcha/silla de ruedas			
M: Escaleras	COMUNICACIÓN 14 puntos	COGNITIVO 35 Puntos	
N: Compresión			
O: Expresión	COGNICION SOCIAL 21 Puntos		
P: Interacción social			
Q: Solución problemas			
R: Memoria			

Cada ítem es puntuado del 1 al 7 de la siguiente manera	
7. Independencia completa 6. Independencia modificada	Sin ayuda
5. Supervisión 4. Asistencia mínima (> 75% de independencia) 3. Asistencia moderada	Dependenci a modificada
2. Asistencia máxima (> 25% de independencia) 1. Asistencia total (< 25% de independencia)	Dependenci a completa

*Research Foundation State
University of New York.
Guide for use the Uniform
data set for Rehabilitation.
New York: University of
New York, 1991.*

**Tabla 4. Escala Cognitiva Rancho los Amigos
(modificada)**

Escala Cognitiva Rancho los Amigos (modificada)		
Nivel	Respuesta	Descripción
Nivel 1	No respuesta	Parece que el paciente estuviera en un sueño profundo y no responde a luces, voces o tacto.
Nivel 2	Respuesta generalizada	El paciente reacciona inconsistentemente, sin que haya ningún tipo de estimulación. La primera reacción puede ser un dolor profundo. Abre los ojos pero no enfoca nada en particular
Nivel 3	Respuesta localizada	Las respuestas del paciente tienen un objetivo, pero son inconsistentes y están directamente relacionadas con el tipo de estímulo presentado. Por ejemplo; al rotar su cabeza para que se concentre en un sonido u objeto; el paciente puede seguir ordenes simples, pero de forma inconsistente y demorada
Nivel 4	Confuso, Agitado	El paciente se encuentra en un estado alto de actividad; severamente confuso, desorientado y no está conciente de los eventos actuales. Reacciona frente a su propia confusión, miedo o desorientación El comportamiento es frecuentemente extraño e inapropiado para el medio ambiente en el que se desenvuelve. Un comportamiento excitable puede llegar a ser abusivo o agresivo
Nivel 5	Confuso, Inapropiado, No agitado	El paciente parece alerta; responde a comandos simples, realiza tareas 2 o 3 minutos, pero se distrae muy fácilmente por cosas en el ambiente; experimenta frustración, lenguaje inapropiado, y no aprende ninguna información nueva
Nivel 6	Confuso - Apropiado	El paciente sigue ordenes simples de forma consistente, necesita guías; puede reaprender antiguas habilidades como las AVD, pero los problemas de memoria interfieren con los nuevos aprendizajes. Tiene algo de conciencia de si mismo y de los otros

Nivel 7	Automático - Apropiado Mínima supervisión para corregir interacción social	El paciente es físicamente capaz, y puede realizar su rutina diaria de forma automática, pero puede tener un comportamiento como el de un robot y una confusión mínima; hay necesidad de recordarle actividades; tiene poca visión acerca de su condición; inicia tareas, pero necesita una estructura; no razona muy bien; no puede resolver conflictos, ni tiene habilidad para planear cosas
Nivel 8	Propósito Apropiado Mínima supervisión para adec. interacc. Social	El paciente está alerta, orientado; recuerda e integra conocimientos pasados y presentes; aprende nuevas actividades y puede continuarlas sin supervisión; independiente en casa y tiene habilidades para las AVD; capaz de conducir; déficit en la tolerancia al estrés, al raciocinio (juicio); persiste el razonamiento abstracto; puede funcionar a un nivel social reducido
Nivel 9	Propósito Apropiado	Paciente realiza varias actividades de forma independiente entre tareas y las completa de forma adecuada por al menos 2 horas consecutivas; está
	No necesita supervisión para adecuar interacción social	conciente de sus impedimentos y de cuando ello le interfiere para terminar sus tareas; requiere de alguna ayuda para anticiparse a los problemas antes de que estos ocurran; puede haber un poco de depresión; puede ser fácilmente irritable y tiene un bajo nivel de tolerancia a la frustración
Nivel 10	Propósito Apropiado Independencia Modificada	El paciente es capaz de realizar simultáneamente múltiples tareas en todos los ambientes posibles, pero requiere descansos periódicamente. Irritabilidad y baja tolerancia a la frustración pueden persistir especialmente cuando se siente enfermo, fatigado y/o bajo estrés emocional.

Hagen C, Malkmus D, Durham P. Rancho los Amigos Hospital, 1972.

Tabla 5. Consistencia Interna de la DRS

Alfa de Cronbach: 0,9453

Covarianza media: 1,4930

Item Eliminado	Alfa de Cronbach
1	0,9415
2	0,9338
3	0,9401
4	0,9354
5	0,9319
6	0,9326
7	0,9365
8	0,95

Grafico 1. Distribución por edad

Distribución por edad




Grafico 2. Distribución por sexo

Distrribución por sexo




Grafico 3. Distribución según gravedad

Distribución según gravedad




Grafico4. Tiempo de Evolución

Tiempo de evolución



Grafico 5. Distribución por ocupación

Distribución por ocupación




Grafico 6. Distribución por ciudad

Distribución por ciudad




Grafico 7. Correlación entre DRS y Escala Rancho los Amigos

$$r = -0,94$$




Grafico 8. Correlación entre DRS y FIM

$$r = -0,94$$

